



# Biomoscab Emulsion

FR

## Consignes pour le traitement de la scabiose

### Chers parents, chers patients,

La gale sarcoptique a été diagnostiquée sur votre peau ou celle de votre enfant. L'infection aux acariens sarcoptes se nomme également scabiose ou gale. Biomoscab vous a été prescrit pour traiter cette maladie contagieuse. Afin que le traitement soit efficace et rapide, veuillez suivre les recommandations de votre médecin et les informations générales suivantes.

### Qu'est-ce qu'une scabiose ?

Les acariens sarcoptes mesurent entre 0,3 et 0,4 mm et creusent des petites galeries dans la couche supérieure de l'épiderme humain avec leurs maxillaires puissantes. Ils préfèrent en général certaines parties du corps, telles que les mains, les pieds, les plis du coude ou la zone pubienne. De fortes démangeaisons apparaissent sur les zones touchées, en particulier la nuit du fait de la chaleur dégagée dans le lit. A l'œil nu ou à la loupe, il est possible de voir des sillons irréguliers ayant la forme d'une virgule. Les nodules longilignes ou vésicules, qui forment ensuite une croûte, résultent en principe des réactions inflammatoires et du grattage au niveau des zones atteintes de démangeaisons. Si la scabiose a été diagnostiquée chez vous ou votre enfant, cela n'est généralement pas dû à un manque d'hygiène personnelle. Les parasites ne font aucune différence entre l'âge, la propreté ou le statut d'une personne. Il est toutefois nécessaire de prendre des mesures d'hygiène si vous souhaitez éliminer définitivement ces parasites. Retrouvez plus d'informations dans le paragraphe suivant.

### Comment la scabiose est-elle transmise ?

Les acariens sarcoptes sont transmis par contact cutané étroit entre les humains. Les premiers symptômes apparaissent en général 2 à 5 semaines après la contamination, un peu moins en cas de ré-infection. La contamination a lieu souvent dans les collectivités, notamment les écoles, crèches, foyers pour enfants, maisons de retraite ou établissements de soins. C'est notamment le cas lorsque plusieurs personnes partagent des dortoirs. La contamination par l'intermédiaire de la literie, de meubles rembourrés ou de couvertures en laine est rare mais possible. Les acariens sarcoptes survivent pendant 2 à 3 jours hors du corps et plus longtemps en environnement froid et humide.



#### Douche ou bain

Avant le premier traitement, prenez un bain ou une douche chaude ! Attendez environ une heure avant d'appliquer Biomoscab pour que votre corps retrouve une température normale.



#### Traitements

Appliquez l'émulsion sur tout le corps en évitant la tête et le visage.



#### Renouvellement du traitement

Répétez l'application de l'émulsion Biomoscab pendant les 3 à 5 jours suivants.

L'infection sarcoptique provoque des démangeaisons cutanées très désagréables pour les patients, qui sont alors tentés de se gratter. L'action acaricide de Biomoscab permet de réduire aussi ces démangeaisons douloureuses.



# BiomoScab Emulsion

Le crotamiton, principe actif de BiomoScab, se caractérise par une bonne tolérance cutanée et s'utilise également chez les enfants, les nourrissons et les nouveau-nés avec prudence.

L'émulsion BiomoScab s'étale facilement sur la peau et se prête particulièrement à une utilisation sur les zones poilues. Elle s'applique facilement, pénètre rapidement et ne tache pas les vêtements.

## Recommandation de traitement en cas d'infestation par les sarcoptes (scabiose) :

1. Avant le premier traitement, prenez un bain ou une douche chaude. Attendez environ une heure avant d'appliquer BiomoScab pour que votre corps retrouve une température normale.
2. Appliquez BiomoScab une fois par jour (le soir) sur tout le corps en partant de la mâchoire inférieure vers le bas et en insistant particulièrement sur les plis et les ongles. N'oubliez pas les parties génitales et la plante des pieds. Pour que le traitement soit efficace, il est important de renouveler l'application de BiomoScab pendant les trois à cinq jours suivants.
3. Si certaines parties du corps sont entrées en contact avec de l'eau après l'application de BiomoScab (par ex. en se lavant les mains), vous devez réappliquer BiomoScab sur ces zones.
4. Après l'application, changez de vêtements afin d'éviter une nouvelle infestation avec des vêtements contaminés.
5. Changez le linge de lit tous les jours. Les serviettes doivent être changées deux fois par jour. Le linge doit être lavé à au moins 60 °C. Les vêtements qui ne sont pas lavables à au moins 60 °C et les autres objets, tels que les peluches ou les chaussures, doivent être placés dans un sac plastique bien fermé pendant 72 heures.
6. Passez l'aspirateur sur les tapis et les meubles rembourrés de manière rigoureuse. En général, ces mesures suffisent pour éliminer une éventuelle prolifération des acariens dans la maison.
7. Pour éviter tout risque de contagion, n'utilisez pas de linge, serviettes, gants de toilette, oreillers, couvertures, peignes et autres objets qui seraient utilisés aussi par d'autres personnes.
8. Les produits pesticides ne sont pas utiles dans la maison. Les désinfectants sont inefficaces contre la gale sarcoptique humaine.
9. Évitez tout contact physique prolongé avec d'autres personnes pendant les 36 premières heures suivant la fin du traitement afin d'éviter de transmettre les acariens.

**Les personnes proches et ayant un contact cutané direct doivent également être traitées, avec l'accord du médecin, afin de stopper le plus rapidement et le plus efficacement possible la transmission et la prolifération des acariens et l'apparition des irritations cutanées qui en découlent.**